


Lecture - 2.01

প্রমত্তা কাঠামো : বস্তুৰ অবস্থান বা পতি বৰ্ণনাৰ জন্য যে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় — তাকে প্রমত্তা কাঠামো বলে।

দূৰত্ব : কোনো গতিশীল বস্তুৰ কোনো দিকে মোট অতিকৃত পথই হল দূৰত্ব। দূৰত্বৰ ইংৰেজি অক্ষ → distance

সরণ : কোনো গতিশীল বস্তু নিদিষ্ট দিকে যে যে দূৰত্ব অতিকৃত কৰে তাকে সরণ বলে।

কোনো গতিশীল বস্তুৰ আদি অবস্থান ও শেষ অবস্থানেৰ মধ্যবর্তী Shortest পথই হল সরণ। সরণৰ ইংৰেজি অক্ষ Displacement.



A কণাটিৰ অতিকৃত দূৰত্ব = 2m

A কণাটিৰ সরণ = 0

দ্রুতি (Speed) : কোনো দিকে বস্তুৰ অবস্থানেৰ পৰিবৰ্তনেৰ হাৰকে দ্রুতি বলে। দ্রুতি scalar হ'ল।

বেগ (Velocity) : সরণৰ পৰিবৰ্তনেৰ হাৰকে বেগ। সরণ হল

Vector রাশি - ১। সার্বিক গতি


দ্রুতি - ১০.৫ - ১০.৫

গড় দ্রুতি (Average Speed)

অন্তিম দ্রুতি

গড় দ্রুতি: যেকোনো সময় ব্যবধানে কোনো বস্তু মোট যেটুকু দূরত্বকে মোট সময় দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাকে গড় দ্রুতি বলে।

$$\text{গড় দ্রুতি, } V = \frac{\text{মোট সরণ}}{\text{মোট সময়}} = \frac{s - 0}{t - 0} = \frac{s_{\text{final}} - s_{\text{initial}}}{t_{\text{final}} - t_{\text{initial}}}$$




গড় দ্রুতি হল $s = f(t)$ এর যেকোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল।

$$V = \frac{ds}{dt}$$

তাত্ত্বিক দ্রুতি: সময় ব্যবধান ক্ষুণ্ণরূপে কাছাকাছি হলে
গড় দ্রুতির সীমাতিক মানকে তাত্ত্বিক দ্রুতি বলে।

$$\text{তাত্ত্বিক দ্রুতি} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{f(x+dt) - f(x)}{dt}$$



$$\Delta s = f(x+dt) - f(x)$$



$$\Delta x = x + dt - x = dt \quad ; \quad dt \rightarrow 0$$

$$\text{তাত্ত্বিক দ্রুতি} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{f(x+dt) - f(x)}{dt}$$

$$= \frac{ds}{dx} \frac{\Delta s}{\Delta x} = \frac{ds}{dx}$$

গড়বেগ এবং তাত্ত্বিক বেগ

গড়বেগ: যেকোনো সময় ব্যবধানে মোট সরণকে মোট সময় দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাকে গড়বেগ বলে।





$$\text{গড়বেগ, } \bar{v} = \frac{s-0}{t-0} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

ভৌকমিক বেগ-ঃ সময় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাহা কত হলে গড়বেগের সীমাতিক মানকে ভৌকমিক বেগ বলে।

$$\text{ভৌকমিক বেগ, } \bar{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

$$v = \frac{ds}{dt}$$



$$\Delta s = f(t + dt) - f(t)$$

$$\Delta t = t + dt - t$$

$$= dt$$

সমবেগে গতির সূত্র



$$S=0$$

$$t=0$$

$$S=2m$$

$$t=1s$$

$$S=4m$$

$$t=2s$$

$$S=6m$$

$$t=3s$$

$$S=8m$$


$$t=4s$$

t	S
0	0
1	2
2	4
3	6
4	8

$$v = \frac{2-0}{1-0} = 2 \text{ ms}^{-1}$$

$$v = \frac{8-2}{4-1} = 2 \text{ ms}^{-1}$$

সমবেগ



$$S = mt$$

$$\frac{ds}{dt} = m \frac{dt}{dt}$$

$$\frac{ds}{dt} = m$$

$$v = m$$


$$\therefore S = vt \quad m = v$$

$$* S = vt$$

সমত্বরণের ক্ষেত্রে গতির সূত্র

যোদিবেগ হল সময় count করার মুহূর্তের বেগ।


সমত্বরণ $\rightarrow$ বেগের পরিবর্তনের হার সমান।



$$t = 0$$

$$s = 0$$

যোদিবেগ, u



$$s = s$$

$$t = t$$

শেষবেগ $= v$

$$\text{ত্বরণ, } a = \frac{dv}{dt} = \frac{v - u}{t}$$

$$= \frac{v - u}{t - 0}$$

$$\Rightarrow at = v - u$$

$$\Rightarrow v = u + at$$

$$* v = u + at$$

$$\rightarrow s = \left(\frac{u + v}{2} \right) t \text{ এর প্রমাণ}$$

$$\text{গড়বেগ, } \bar{v} = \frac{\text{মোট সরণ}}{\text{মোট সময়}} = \frac{s}{t}$$

প্রতি সমত্বরণে সরলরৈখিক অক্ষে চললে গড়বেগ,

$$\bar{v} = \frac{u + v}{2}$$

$$\Rightarrow S = \frac{u+v}{2} \cdot t$$

$$\Rightarrow S = \left(\frac{u+v}{2} \right) t$$

$$* S = \left(\frac{u+v}{2} \right) \cdot t$$

$$\& S = ut + \frac{1}{2} at^2 \text{ এর প্রমাণ}$$

$$\text{প্রতিবেগ, } v = \frac{s}{t}$$

$$\Rightarrow S = \bar{v} t$$

$$\Rightarrow S = \left(\frac{u+v}{2} \right) t$$

$$\Rightarrow S = \left(\frac{u+u+at}{2} \right) t$$

$$= \left(\frac{2u+at}{2} \right) t$$

$$\Rightarrow S = ut + \frac{1}{2} at^2$$

$$* S = ut + \frac{1}{2} at^2$$

$$\& v^2 = u^2 + 2as \text{ এর প্রতিষ্ঠাপন}$$

$$S = \bar{v} t$$

$$\Rightarrow S = \left(\frac{u+v}{2} \right) \left(\frac{v-u}{2a} \right)$$

$$v = u + at$$

$$at = v - u$$

$$t = \frac{v-u}{a}$$


$$\Rightarrow S = \frac{v^2 - u^2}{2a}$$

$$\Rightarrow v^2 = u^2 + 2as$$

ক্যালকুলাসের মাসাম্যে গতির সূত্র- প্রমাণ

মসব্বেসে গতি

সূত্র



$$t = 0$$

$$s = 0$$



$$t = t$$

$$s = s$$

$$v = \text{constant}$$

তাত্ত্বিক বেগ, $v = \frac{ds}{dt}$

$$\Rightarrow ds = v dt$$


$$\Rightarrow \int_0^s ds = v \int_0^t dt$$

$$\Rightarrow [s]_0^s = v [t]_0^t$$

$$\Rightarrow s - 0 = v(t - 0)$$


$$\Rightarrow s = vt$$

মসব্বেসে গতি সূত্র :



$$s = 0$$

$$t = 0$$

আদিবেগ, u 

$$t = t$$

$$s = s$$

মসব্বেসে v

তাত্ত্বিক ত্বরণ, $a = \frac{dv}{dt}$

$$\Rightarrow dv = a dt$$

$$\Rightarrow \int_u^v dv = a \int_0^t dt$$

$$= [v]_u^v = a [t]_0^t$$

$$\Rightarrow v - u = a(t - 0)$$

$$\Rightarrow v = u + at$$

୧୨୨, $v = \frac{ds}{dt}$

$$\Rightarrow ds = v dt$$

$$\Rightarrow ds = (u + at) dt$$

$$\Rightarrow ds = u dt + at dt$$

$$\Rightarrow \int_0^s ds = u \int_0^t dt + a \int_0^t t dt$$

$$\Rightarrow \int_0^s [s]_0^s = u [t]_0^t + a \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^t$$

$$\Rightarrow s - 0 = u(t - 0) + a \cdot \frac{t^2}{2}$$

$$\Rightarrow s = ut + \frac{1}{2} at^2$$

୧୨୩ମିନି ପ୍ରଶ୍ନ, $a = \frac{dv}{dt}$

$$\Rightarrow a = \frac{dv}{ds} \cdot \frac{ds}{dt}$$

$$\Rightarrow a = \frac{dv}{ds} \cdot v$$

Sub: _____

NOTE'S

Date: _____

Time: _____

$$\Rightarrow a ds = v dv$$

$$\Rightarrow a \int ds = \int v dv$$

$$\Rightarrow a \int_0^s ds = \left[\frac{v^2}{2} \right]_u^v$$

$$\Rightarrow a [s]_0^s = \left[\frac{v^2}{2} \right]_u^v$$

$$\Rightarrow a(s-0) = \frac{v^2}{2} - \frac{u^2}{2}$$

$$\Rightarrow 2as = v^2 - u^2$$

$$\Rightarrow v^2 = u^2 + 2as$$

Lecture - 3.02

16 Dec 2020.


গড়দ্রুতি ও গড়বেগ নংকট

গাণিতিক সমস্যাবলী ও সমাধান

→ একজন বালক ৩ min সময়ে অর্ধবৃত্তাকার পথে A হতে B বিন্দুতে পৌঁছায়। বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৩ m হলে বালকের গড়দ্রুতি এবং গড়বেগ কত?

→ গড়দ্রুতি, $\bar{v} = \frac{\text{মোট দূরত্ব}}{\text{মোট সময়}}$

$$= \frac{2\pi r}{3}$$



$$\bar{v} = \frac{3\pi}{2}$$

$$= \pi \text{ m/min}$$

$$= 3.1416 \text{ m (min)}^{-1}$$

গড়বেগ, $\bar{v} = \frac{\text{মোট দূরত্ব}}{\text{মোট সময়}} = \frac{2\pi}{3}$

$$= \frac{2 \times 3}{3}$$

$$= 2 \text{ m (min)}^{-1}$$

* সরলরৈখিক পথে চলমান বস্তুর গড়দ্রুতি ও গড়বেগ সমান।

Case-01 : প্রথম S একক দূরত্ব v_1 এবং পরবর্তী S একক দূরত্ব v_2 দ্রুতিতে অতিক্রান্ত বস্তুর গড়দ্রুতি নির্ণয়:

v_1	v_2
$S_1 = S$	$S_2 = S$
সময় = t_1	সময় = t_2

$$\text{গড়দ্রুতি} = \frac{\text{মোট দূরত্ব}}{\text{মোট সময়}} = \frac{S_1 + S_2}{t_1 + t_2}$$

$$= \frac{S + S}{\frac{S}{v_1} + \frac{S}{v_2}}$$

$$= \frac{2S}{S \left(\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} \right)}$$

$$\begin{aligned} S &= v_1 t_1 \\ t_1 &= \frac{S}{v_1} \end{aligned}$$

Sub :


NOTE'S

Date :
Time :

$$\Rightarrow \bar{v} = \frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$$

$$\text{প্রভুদ্রুতি} = \frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$$

Case-02: সমান্তরাল এবং দূরত্ব ও বেগ দিবে



$$\text{প্রভুদ্রুতি } \bar{v} = \frac{\text{মোট দূরত্ব}}{\text{মোট সময়}}$$

$$= \frac{s_1 + s_2}{t + t}$$

$$= \frac{v_1 t_1 + v_2 t_2}{2t}$$

$$= \frac{v_1(t+t) + v_2(t+t)}{2t}$$

$$= \frac{v_1 + v_2}{2}$$

$$\text{প্রভুদ্রুতি} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

Case-03: সমান্তরাল সব রাশি দিবে ২লে

$$\text{গড়দ্রুতি } \bar{v} = \frac{\text{মোট দূরত্ব}}{\text{মোট সময়}}$$

$$= \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2}$$

→ একটি গাড়ি তার যাত্রাপথের অর্ধেক দূরত্ব 40 kmh^{-1} বেগে এবং বাকি অর্ধেক দূরত্ব 60 kmh^{-1} বেগে সরলরৈখিক পথে যেতাকম করে। তার গড়বেগ নির্ণয় কর।

$$\Rightarrow v_1 s_1 = 40 \text{ kmh}^{-1}$$

$$v_2 s_2 = 60 \text{ kmh}^{-1}$$

$$s_1 = s$$

$$s_2 = s$$

$$\begin{aligned} \text{গড়বেগ } \bar{v} &= \frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2} \\ &= \frac{2 \times 40 \times 60}{100} \\ &= 48 \text{ kmh}^{-1} \end{aligned}$$

→ একজন বালক সাইকেল চালিয়ে বাড়ি থেকে 5 ms^{-1} বেগে ধুলে যায় এবং 6 ms^{-1} বেগে বাড়িতে ফিরে আসে। তার গড়দ্রুতি ও গড়বেগ নির্ণয় কর।

$$\Rightarrow \text{গড়দ্রুতি} = \frac{\text{মোট দূরত্ব}}{\text{মোট সময়}} = \frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$$

$$\Rightarrow \text{গড়দ্রুতি } v = \frac{2 \times 5 \times 6}{5+6}$$

$$= 5.45 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{গড়বেগ} = \frac{\text{মোট সরণ}}{\text{মোট সময়}}$$

$$= \frac{0}{t}$$

$$= 0 \text{ ms}^{-1} \text{ (Ans.)}$$

17 Dec 2020

গতির গ্রাফসমূহ

① সমবেগ -

S

0

v

0

a

0

$$S = vt$$

$$y = mx$$

$$m = v \text{ (constant)}$$

$$v = \frac{ds}{dt}$$

$$\text{চাল} = \frac{dv}{dt}$$

$$\text{চাল} = v \frac{d}{dt} 0 \text{ [v constant]}$$

$$\begin{aligned} \text{চাল} &= \frac{da}{dt} \quad (a=0) \\ &= \frac{d}{dt} (0) = 0 \end{aligned}$$

Sub: _____

NOTE'S

Date: _____

Time: _____

② সমস্যা-৭

S ↑

0

v ↑

0

a ↑

0

$$S = ut + \frac{1}{2}at^2$$

আদিবেগ 0 ms^{-1} হলে

$$S = \frac{1}{2}at^2 \quad \text{যদি } k = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow t^2 = 2 \frac{1}{a} S$$

$$y^2 = 4Ax; \quad A = \frac{1}{2a}, \quad x = S$$

$$\Rightarrow x^2 = 4A y, \quad y = t$$

$$\text{সম্পাদন, } A = \frac{1}{2a}, \quad x = t, \quad y = S$$

$$x \quad \text{যদি, } v = \frac{ds}{dt}$$

$$v = \frac{d}{dt} \left(ut + \frac{1}{2}at^2 \right)$$

$$\Rightarrow v = u + at$$

$$y = mx + c$$

$$\text{তাই, } m = \frac{dv}{dt} = a$$

$$u = 0 \text{ হলে, } v = at$$

$$y = mx$$

$$v = u + at \quad \text{তাই, } \frac{d(u)}{dt}$$

$$at = v - u$$

$$a = \frac{v - u}{t} = 0$$

x

③ समझान

S ↑

$$S = ut - \frac{1}{2}at^2$$

$$u = 0 \text{ (म)} \quad \text{2 (म)}$$

$$S = -\frac{1}{2}at^2$$

$$t^2 = -2 \frac{1}{a} S$$

$$t^2 = -4AS$$

$$\text{समझान, } A = +\frac{1}{2a}$$

V ↑

$$S = ut - \frac{1}{2}at^2$$

$$\frac{ds}{dt} = u - at$$

$$V = u - at$$

$$V = -at + u$$

$$y = -mx + c$$


a ↑

t

-a

গ্রাফ থেকে গতির সূত্র অন্বেষণ

$s = ut + \frac{1}{2}at^2$



ট্রাজিগনাম AOBP এর ক্ষেত্রফল = AOBP এর ক্ষেত্রফল + ΔABP
 $= ut + \frac{1}{2}t \cdot pd$
 সরণ, $S = ut + \frac{1}{2}at^2$

গ্রাফের সাহায্যে গতির problem solve করতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য করি।

- (i) x অক্ষের সমসং নিতে হবে
- (ii) y " বেগ " "

ক্ষেত্রফল = সরণ

ঢাল = ত্বরণ

❖ একটি গাড়ি কোনো স্থান থেকে 10 ms^{-1} বেগে অতিক্রম করার পর 2 ms^{-2} ত্বরণ নিয়ে 5 sec চলল। গাড়ি কত দূরত্ব ও 5 sec পর বেগ কত?

⇒ $u = 10 \text{ ms}^{-1}$
 $a = 2 \text{ ms}^{-2}$
 $t = 5 \text{ sec}$

$$v = u + at = 10 + 2 \times 5 = 20 \text{ ms}^{-1}$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$= 10 \times 5 + \frac{1}{2} \times 2 \times 25$$


$$= 75 \text{ m.}$$

❖ Lecture: 3.03

❖ 50 kg ভরের একজন চালক 950 kg ভরের একটি গাড়ি স্টিয়ারিং হতে 10 sec সময়কাল চালাল। অতঃপর 10 min সময়বেগে চালানোর পরে 5 sec সময়ের মধ্যে চালক গাড়িটিকে ব্রেক প্রয়োগ করে থামালো। যাত্রা শুরু 2 sec এ গাড়ির অর্ধিত বেগ 4 ms^{-1} হলে গাড়ির মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব = ?

⇒ ত্বরণ, $a = \frac{4-0}{2-0} = 2 \text{ ms}^{-2}$


10 s এ বেগ, $v = 2 \times 10 = 20 \text{ ms}^{-1}$



$$\begin{aligned}
 S &= S_1 + S_2 + S_3 \\
 &= \frac{1}{2} \times 10 \times 20 + 600 \times 20 + \frac{1}{2} \times 5 \times 20 \\
 &= 100 + 12000 + 50 \\
 &= 12150 \text{ m.}
 \end{aligned}$$

$\therefore$ গাড়িটির মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব $= 12150 \text{ m. (Ans.)}$


একটি গাড়ি A স্টেশন হতে দ্বিগুণ দ্রুত যাত্রা শুরু করে সমত্বরণে চলে B স্টেশন পৌঁছায়। অতপর সমমন্দনে চলে C স্টেশনে গিয়ে থামে। গিয়ে থামে। যাত্রা শেষে সর্বোচ্চ বেগ 60 km/h এবং যাত্রাকালের মোট সময় 2 h হলে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব $= ?$



অতিক্রম দূরত্ব, $S = \frac{1}{2} \times 2 \times 3600 \times \frac{1}{2} \times 2 \times 60$
 $= 60 \text{ km. (Ans)}$

→ একটি গাড়ি প্রথম 2 sec এ 100m এবং পরবর্তী 4 sec এ 104m দূরত্ব অতিক্রম করে। গাড়িটির আদিবেগ এবং ত্বরণ নির্ণয় কর। ত্বরণ অশরিরবর্তিত থাকলে গাড়িটির পরবর্তী 4 sec এ কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?

→



$$S_1 = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$\Rightarrow 100 = 2u + 2a$$

$$\Rightarrow u + a = 50 \quad \text{--- (i)}$$

$$(S_1 + S_2) = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$\Rightarrow 100 + 104 = 6u + 18a$$

$$\Rightarrow u + 3a = 34 \quad \text{--- (ii)}$$

i ও ii সমাধান করে পাই,

আদিবেগ, $u = 58 \text{ ms}^{-1}$

ত্বরণ, $a = (50 - 58) \text{ ms}^{-2}$

$$= -8 \text{ ms}^{-2}$$

10 sec এ গাড়িটির অতিক্রম দূরত্ব, $s = 100 ut + \frac{1}{2} at^2$

$$= 58 \times 10 - \frac{1}{2} \times 8 \times 100$$

$$= 580 - 400$$

$$= 180 \text{ m.}$$

∴ মোট 4 sec এ গাড়িটির অতিক্রম দূরত্ব = $180 - 204$

$$= -24 \text{ m}$$

∴ মোট 4 sec এ গাড়িটি আদিবেগের বিপরীত দিকে 24m দূরত্ব অতিক্রম করবে।

→ দুটি গাড়ি যথাক্রমে 10 ms^{-1} ও 5 ms^{-1} বেগ নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। গাড়ি দুটির ত্বরণ যথাক্রমে 2 ms^{-2} এবং 3 ms^{-2} । গাড়ি দুটি যদি একই সময়ে মোট প্রাচীর পৌঁছে তবে কতকাল ধরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল?

⇒ ধরি, সময় = t

$$u_1 = 10 \text{ ms}^{-1}$$

$$a_1 = 2 \text{ ms}^{-2}$$

$$u_2 = 5 \text{ ms}^{-1}$$

$$a_2 = 3 \text{ ms}^{-2}$$

$$s = u_1 t + \frac{1}{2} a_1 t^2$$

$$= 10t + \frac{1}{2} \times 2 \times 100 t^2$$

$$= 10t + t^2 \quad \text{--- (i)}$$

$$s = u_2 t + \frac{1}{2} a_2 t^2$$

$$= 5t + 1.5t^2 \quad \text{--- (ii)}$$

$$(i - ii) \Rightarrow 5t - 0.5t^2 = 0$$

$$\Rightarrow t^2 - 10t = 0$$

$$\Rightarrow t(t - 10) = 0$$

$$\Rightarrow t - 10 = 0$$

$$\Rightarrow t = 10 \quad (\text{Ans.})$$

Ex: চন্ডীয়া 108 km বেগে চলমান একটি গাড়ির চালক তার 100 m সামনে একটি বালকে দেখতে পেলেন। সাথে সাথে ব্রেক প্রয়োগ করুন করায় গাড়িটি বালকে 10 m সামনে এসে থেমে গেল। গাড়িতে প্রযুক্ত মন্দন এবং গাড়িটি থামতে কত সময় লেগেছিল?

⇒

$$u = 108 \text{ kmh}^{-1}$$

$$s = 10 \times 10^{-3} \text{ m/km}$$

$$v = 0$$

$$a = ?$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$\Rightarrow u^2 + 2as = 0$$

$$\Rightarrow 2as = -u^2$$

$$\Rightarrow a = \frac{-u^2}{2s} = \frac{-(108)^2}{2 \times 10 \times 10^{-3}}$$

$$\Rightarrow a = -563200 \text{ kmh}^{-2}$$

$$u = 108 \text{ kmh}^{-1}$$

$$= 30 \text{ ms}^{-1}$$

$$s = 10 \text{ m} - 90 \text{ m}$$

$$v = 0 \text{ ms}^{-1}$$

$$a = ?$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$\Rightarrow 2as = -u^2$$

$$\Rightarrow a = \frac{-u^2}{2s} = \frac{-30^2}{2 \times 90} = -5 \text{ m/s}^2$$

$\therefore$ অমুক্ত মন্দন 5 m/s^2

$$\text{আবার, } v = u + at$$

$$t = \frac{-u}{a} = \frac{-30}{-5} = 6 \text{ sec.}$$

সময়, $t = 6 \text{ sec}$ (Ans.)

→ একটি গুলি কোনো দেওয়ালের মধ্যে 0.12 m প্রবেশের পর এর বেগ অর্ধেক হয়ে যায়। গুলিটি এ দেওয়ালের মধ্যে আর কতদূর প্রবেশ করবে?

→

u	a 0.12 m	
	s_1	s_2

$$v = \frac{u}{2}$$

$$v^2 = u^2 - 2as_1$$

$$\Rightarrow 2as_1 = u^2 - v^2$$

$$= u^2 - \frac{u^2}{4} = \frac{3u^2}{4}$$

$$\Rightarrow a = \frac{3u^2}{4s_1}$$

আবার, $0^2 = u^2 - 2as_2$

$$\Rightarrow 2as_2 = u^2$$

$$\Rightarrow s_2 = \frac{u^2}{2a} = \frac{u^2}{\frac{3u^2}{4s_1}}$$

$$\Rightarrow 0^2 = \left(\frac{u}{2}\right)^2 - 2as_2$$

$$\Rightarrow 2as_2 = \frac{u^2}{4}$$

$$\Rightarrow s_2 = \frac{u^2}{4 \times 2a} = \frac{u^2}{4 \times \frac{3u^2}{4s_1}} = \frac{s_1}{3}$$

$$\Rightarrow s_2 = \frac{0.12}{3} = 0.04 \text{ m (Ans.)}$$

Shortcut: একটি গুলি কোনো দেয়ালের দিকে s_1 দূরত্ব অতিক্রমের পর কিছু অসিমান বেগ হারিয়ে আবার s_2 দূরত্ব অতিক্রম করে তবে $s_2 = \frac{s_1}{n^2 - 1}$

$$\frac{1}{n} = \text{বেগের অবশিষ্ট অংশ}$$

Ex একটি গুলি কোনো দেয়ালের মাঝে প্রবেশের পর বেগ ৭৫% বেগ হারিয়ে 0.06 m প্রবেশ করে অতিক্রম করে

Ex একটি গুলি কোনো দেয়ালের মাঝে 0.06 m প্রবেশের পর বেগ ৭৫% হারায়। গুলিটি আর কতদূর প্রবেশ করবে

$$\Rightarrow S_2 = \frac{S_1}{n^2 - 1}$$

$$= \frac{0.06}{4^2 - 1}$$

$$= 4 \times 10^{-3} \text{ m (Ans.)}$$

$$\frac{1}{n} = 25 \lambda$$

$$\frac{1}{n} = \frac{25}{100}$$

$$n = 4$$

৪) একটি বিমানবন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য 100 m. রানওয়ে থেকে 1 টি বিমান উড়ে গলে 216 kmh⁻¹ বেগ প্রাপ্ত হতে হয়। 15 m/s² ত্বরণে প্রসারিত হওয়ায় কোনো বিমান উক্ত রানওয়ে থেকে উড়ে যে সমসম হলে কি ১ টি উড়ে গলে রানওয়ের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়? কত হতে পারে?

$$\Rightarrow v = 216 \text{ kmh}^{-1}$$

$$= 60 \text{ ms}^{-1}$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$\Rightarrow 2as = v^2$$

$$\Rightarrow s = \frac{v^2}{2a} = \frac{60^2}{15 \times 2}$$

$$\Rightarrow s = 120 \text{ m.}$$

সুতরাং বিমানটি উড়ে পারবে না। বিমানটি উড়ে গলে রানওয়ের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় 120 m হতে পারে।

Lecture - 3.09

মুখম ঘরনে চলমান বস্তুগার ক্ষেত্রে t তম সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব - নির্ণয়

$$t \text{ sec এ বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব, } s_t = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$(t-1) \text{ sec " " " " } s_{(t-1)} = u(t-1) + \frac{1}{2}a(t-1)^2$$

$$t \text{ তম sec এ বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব, } s_{th} = s_t - s_{(t-1)}$$

$$s_{th} = ut + \frac{1}{2}at^2 - \{u(t-1) + \frac{1}{2}a(t-1)^2\}$$

$$s_{th} = ut + \frac{1}{2}at^2 - ut + u - \frac{1}{2}a(t^2 - 2t + 1)$$

$$= ut + \frac{1}{2}at^2 - ut + u - \frac{1}{2}at^2 + at - \frac{1}{2}a$$

$$s_{th} = u + \frac{1}{2}a(2t-1)$$

$$* t \text{ তম সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব } s_{th} = u + \frac{1}{2}a(2t-1)$$

→ একটি গাড়ি দ্বিগুণ দূরত্ব হতে চল মুখম ঘরনে চল 2sec এ 8m দূরত্ব অতিক্রম করে। গাড়িটি ৫ম সেকেন্ডে কতদূর দূরত্ব অতিক্রম করবে?

$$\Rightarrow \text{দ্বিগুণ, } a = s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$8 = 0 + \frac{1}{2}a \times 4$$

$$\Rightarrow 2a = 8$$

$$\Rightarrow a = 4 \text{ m/s}^2$$

$$5 \text{ তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব, } s_{th} = u + \frac{1}{2}a(2t-1)$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times (10-1) = 18 \text{ m}$$

$$= 18 \text{ m (Ans)}$$

একটি গাড়ি ৭th সেকেন্ডে 30m এবং 19th সেকেন্ডে 50m দূরত্ব অতিক্রম করে। গাড়িটি 1ম সেকেন্ডে 8 সেকেন্ডে মোট কতদূর দূরত্ব অতিক্রম করে?

⇒ ৭th সেকেন্ডে অতিক্রম দূরত্ব, $S_{7th} = ut + \frac{1}{2}at^2$

$$S_{7th} = u + \frac{1}{2}(16-1)a$$

$$\Rightarrow 30 = u + 17/2 a$$

$$\Rightarrow 17a + 2u = 60 \text{ --- (i)}$$

19th সেকেন্ডে 2ম সেকেন্ডে

$$S_{19th} = u + \frac{1}{2}a(2 \times 19 - 1)$$

$$\Rightarrow 50 = u + 37/2 a$$

$$\Rightarrow 37a + 2u = 100 \text{ --- (ii)}$$

i. ও ii Solve করে পাই, $a = 2 \text{ ms}^{-2}$

$$u = 13 \text{ ms}^{-1}$$

৪ম ৪ sec এ অতিক্রম দূরত্ব, $S = ut + \frac{1}{2}at^2$

$$= 13 \times 8 + \frac{1}{2} \times 2 \times 64$$

$$= 168 \text{ m}$$

সমসংগে গতির সূত্র

$$S = vt \rightarrow S \propto t$$

সমবর্তনে গতির সূত্র

$$S = ut + \frac{1}{2}at^2 \rightarrow u = 0 \text{ হলে } S = \frac{1}{2}at^2$$

$$v = u + at$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$S \propto t^2$$

$$S' \propto t^2$$

সমসময়নে গতির সূত্র—

$$s = ut - \frac{1}{2}at^2 \rightarrow s \propto t^2$$

$$v = u - at$$

$$v^2 = u^2 - 2as$$

অসমত্বরণ / অসমসময়নে

$$s \propto t^2$$

যেখানে $x > 2$

$$\frac{d}{dt}(\text{সরণ}(s)) = \frac{d}{dt}(\text{বেগ}(v)) = \text{ত্বরণ} = a$$

$$\int \text{ত্বরণ} dt =$$

$$* \text{ সরণ } \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \text{বেগ}(v) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \text{ত্বরণ}(a)$$

$$\text{সরণ}(s) \xleftarrow{\int dt} \text{বেগ}(v)$$

→ একটি কণার সরণের সমীকরণ $s = (3t^3 + 4t + 2) \text{ m}$
কণাটির $t = 2 \text{ sec}$ সময়ে বেগ এবং ত্বরণ নির্ণয় কর।

$$\Rightarrow s = (3t^3 + 4t + 2) \text{ m}$$

$$\text{বেগ}, v = \frac{ds}{dt} = (9t^2 + 4) \text{ m/s}$$

$$t = 2 \text{ sec} \text{ সময়ে বেগ} = 36 + 4 = 40 \text{ m/s}$$

১মঃ $a = \frac{dv}{dt} = 18t + 4$

$t = 2 \text{ sec}$ সময়ে দ্রবণ $= 18 \times 2 = 36 \text{ m/s}^2$

২মঃ তিনটি গাড়ির বেগ যথাক্রমে $v = 3t$, $v = -3t$ এবং $v = 2t^2$ । কোনকোনো দ্রবণের প্রকৃতি কতমান হবে?

১মঃ $a = \frac{dv}{dt} = 3 \text{ m/s}^2 \rightarrow$ সমদ্রবণ

২মঃ $a = -3 \text{ m/s}^2 \rightarrow$ সমসমান

৩মঃ $a = 18t \rightarrow$ অসমদ্রবণ

৩মঃ কোনো কণার দ্রবণের সমীকরণ $a = (2t^2 + 5) \text{ m/s}^2$, $t = 2 \text{ sec}$ সময়ে কণার বেগ এবং অতিক্রান্ত দূরত্ব কত?

১মঃ বেগ, $v = \int a dt$
 $= \int (2t^2 + 5) dt$

$= \frac{2}{3} t^3 + 5t + C$

$t = 2 \text{ sec}$ সময়ে বেগ $= \left[\frac{2}{3} t^3 + 5t + C \right]_0^2$

$= \frac{2}{3} \times 8 + 5 \times 2$

$= 15.33 \text{ m/s}$

অতিক্রান্ত দূরত্ব, $S = \int_0^2 v dt$

$= \int_0^2 \left(\frac{2}{3} t^3 + 5t \right) dt$

$$xt = 5 \text{ sec}$$

২০৪ ১১/১১/১১

১. মাদ ৫ sec এর বামে উঠে পারবে।

(ii) ধরি, অনির বামের পোছন দরজা হতে x m দূর হতে ১০m বেগে দৌড়ালে t sec এর বামে উঠে পারবে।

$$t \text{ sec এ বামের অতিক্রান্ত দূরত্ব } S_1 = \frac{1}{2} \cdot 2t^2 = t^2$$

$$t \text{ sec এ অনির অতিক্রান্ত দূরত্ব } S_2 = 10t$$

$$\text{প্রাপ্তমতে, } S_2 = S_1 + x$$

$$\Rightarrow 10t = t^2 + x$$

$$\Rightarrow t^2 - 10t + x = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$D \geq 0$ হলে মূলদুই বাস্তব হবে।

$$\therefore 100 - 4x \geq 0$$

$$4x \leq 100$$

$$x \leq 25$$

বামের পোছন দরজা হতে ন্যূনতম ২৫m দূর থেকে দৌড়ালে বামে উঠা সম্ভব। কিন্তু অনির পোছন দরজা হতে ৩০m দূর থেকে দৌড় শুরু করে। তাই অনির বামে উঠতে পারবে না।

Sub:

NOTE'S

Date: 18-12-20
Time:

Lecture 9.03

গ্যালিলিওর অভিজ্ঞতা বম্বুর সূত্র

১ম সূত্র: স্থির অবস্থান থেকে বিনা বায়বীয় অভ্রম সমান বম্বু সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।

২য় সূত্র: স্থির অবস্থান থেকে অভ্রম বম্বুর নির্দিষ্ট মুহূর্তের বেগ

২য় সূত্র: স্থির অবস্থান থেকে বিনা বায়বীয় অভ্রম বম্বুর নির্দিষ্ট মুহূর্তের বেগ এ সময়ের সমানুপাতিক

$$v = u + at$$

$$v = gt$$

$$v \propto t$$

$$* \frac{v_1}{t_1} = \frac{v_2}{t_2} = \frac{v_3}{t_3} = \text{ধ্রুবক}$$

৩য় সূত্র: স্থির অবস্থান থেকে বিনা বায়বীয় অভ্রম বম্বুর অতিক্রান্ত দূরত্ব এ সময়ের বর্গের সমানুপাতিক।

$$h = ut + \frac{1}{2}gt^2$$

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

$$h \propto t^2$$

$$\therefore \frac{h_1}{t_1^2} = \frac{h_2}{t_2^2} = \frac{h_3}{t_3^2} = \text{ধ্রুবক}$$

sub:


NOTE'S

Date:

Time:

* অড়ন বস্তুর ক্ষেত্রে গতি সমীকরণসমূহঃ ০-১১৫৭
 প্রমোদ কোমল

Type Case-01: উপর থেকে বস্তু খাড়া উপরে নিক্ষেপ



$$-v = -u - gt$$

$$(1) v = u + gt$$

$$(2) -h = -ut - \frac{1}{2}gt^2$$

$$h = ut + \frac{1}{2}gt^2$$

$$(3) -v^2 = -u^2 - 2g$$

Case-02: নিচ থেকে খাড়া উপরে নিক্ষেপ

Type-01: সবোর্ড উচ্চতায়
 পৌঁছানোর আগে

$$v = ut - gt$$

$$h = ut - \frac{1}{2}gt^2$$

Type-02: সবোর্ড উচ্চতায়
 পৌঁছানোর পরে

$$v = ut - gt$$

$$h = ut - \frac{1}{2}gt^2$$


Sub:

NOTE'S

Date: 17-12-20

Time:

Case-03: নিচ থেকে উপরে নিষ্ক্ষেপ কিছু বস্তু
 পোড়ালে নিষ্ক্ষেপ বিন্দুর নিচে



$$v = +u - gt$$

$$h = +ut - \frac{1}{2}gt^2$$

$h \rightarrow (+ve)$ হলে সরল উপরের দিকে হলে

$h \rightarrow (-ve)$ " " " নিচের " "

h নির্ণয় করতে হলে h এর আগে ঠিক বসাতে
 হবে না।

একটি বস্তুকে আড়া উপরে দিকে 98 ms^{-1} বেগে
 নিষ্ক্ষেপ করা হল। দেওয়া যে 3 sec ও 17 sec এ
 বস্তুর বেগের মান সমান এবং বিপরীতমুখী।



$$u = 98 \text{ ms}^{-1}$$

$$t_1 = 3 \text{ sec}$$

$$t_2 = 17 \text{ sec}$$

Sub:

NOTES

Date:

Time:

3 sec এ বেগ: $v_1 = u - gt_1$

$$= 98 - 9.8 \times 3$$

$$= 68.6 \text{ ms}^{-1}$$

17 sec এ বেগ: $v_2 = u - gt_2$

$$= 98 - 9.8 \times 17$$

$$\Rightarrow v_2 = -68.6 \text{ ms}^{-1}$$

$$\Rightarrow v_2 = -v_1$$

সুতরাং 3 sec ও 17 sec এ বেগ সমান এবং
বিপরীতমুখী।

❖ 10 m উচ্চতা হতে একটি বস্তুকে 20 ms^{-1} বেগে খাড়া উপরে নিক্ষেপ করা হল। ক্রমিকভাবে বস্তুটির কত সময় লাগবে?

$$\Rightarrow u = 20 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{সরল, } h = -10 \text{ m}$$

$$g = 9.8 \text{ ms}^{-1}$$

$$t = ?$$

$$\text{আমরা জানি, } h = ut - \frac{1}{2}gt^2$$

$$\Rightarrow -10 = 20t - \frac{1}{2} \times 9.8 t^2$$

$$\Rightarrow 4.9t^2 - 20t - 10 = 0$$

$$\Rightarrow t = 4.53 \text{ sec}$$

$\therefore$ ক্রমিকভাবে বস্তুটির 4.53 sec লাগবে।

→ 10m উচ্চতা হতে একটি বস্তুকে 20 ms^{-1} বেগে নিচে নিক্ষেপ করা হল। বস্তুটির ক্ষমিতে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে?

⇒ $u = -20 \text{ ms}^{-1}$
 $h = -10 \text{ m}$
 $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$
 সময়, $t = ?$

আমরা জানি,

$$-h = -ut - \frac{1}{2}gt^2$$

$$\Rightarrow h = ut - \frac{1}{2}gt^2$$


$$\Rightarrow -10 = -20t - 4.9t^2$$

$$\Rightarrow 4.9t^2 + 20t + 10 = 0$$

$$\Rightarrow t = 0.45 \text{ sec.}$$

∴ বস্তুটির ক্ষমিতে পৌঁছাতে 0.45 sec সময় লাগবে।

খাড়া উল্লম্ব নিক্ষেপ বস্তু—
 ক্রান্তে মর্বোচ্চ উচ্চতা



$$v^2 = u^2 - 2gh$$

$$0 = u^2 - 2gh$$

$$\Rightarrow h = \frac{u^2}{2g}$$

$$* h_{\max} = \frac{u^2}{2g}$$

নবোচ্চ উচ্চতায় উঠতে সময়, $t =$ নির্ণয়:

$$v = u - gt$$

$$\Rightarrow 0 = u - gt$$

$$\Rightarrow t = \frac{u}{g}$$

নবোচ্চ উচ্চতায় উঠতে সময়, $t = \frac{u}{g}$

উৎক্ষিপ্তকাল বা বিবেগকাল নির্ণয়-

$$h = ut - \frac{1}{2}gt^2$$

$$\Rightarrow 0 = ut - \frac{1}{2}gt^2$$

$$\Rightarrow gt^2 = 2ut$$

$$\Rightarrow gt^2 - 2ut = 0$$

$$\Rightarrow t(gt - 2u) = 0$$

$$\Rightarrow t = 0 \text{ অথবা } gt = 2u$$

$$t = \frac{2u}{g}$$

$\therefore$ উৎক্ষিপ্তকাল বা বিবেগকাল, $T = \frac{2u}{g}$

✶ একটি বস্তুকে ২০০ m উচ্চতা হতে ফেলে দেওয়া হল।
অপর একটি বস্তুকে ৮০ m/s বেগে খাড়া উপরে নিক্ষেপ-
করা হল। বস্তুদ্বয় কখন ও কত উচ্চতায় মিলিত হবে।


Sub: ~

NOTE'S

Date: _____

Time: _____

⇒ মনে করি বস্তুদ্বয় t সময় পর x উচ্চতায় মিলিত হবে।



১ম বস্তু কন্ট্রোল:

$$-(200-x) = -50t - \frac{1}{2} \times 9.8t^2$$

$$-200+x = -4.9t^2$$

২য় বস্তু কন্ট্রোল:

$$x = 50t - \frac{1}{2} \times 9.8t^2$$

$$\Rightarrow 4.9t^2 - 50t + x = 0$$

$$\Rightarrow -200+x - 50t + x = 0$$

⇒ একটি বস্তুকে 200m উচ্চতা হতে ফেলে দেওয়া হল। অপর একটি বস্তুকে 50m/s বেগে খাড়া উল্লারে নিক্ষেপ করা হল। বস্তুদ্বয় কখন ও কত উচ্চতায় মিলিত হবে?

⇒ মনে করি বস্তুদ্বয় t সময় হতে x উচ্চতায় t সময় পরে মিলিত হবে।

১ম বস্তু কন্ট্রোল, $-(200-x) = ut - \frac{1}{2}gt^2$

Sub:


NOTES

Date:

Time:

$$\Rightarrow -200 + x = -4.9t^2$$

নিম্নস্থ বস্তুর ক্ষেত্র:



$$x = 200 - 4.9t^2$$

$$\Rightarrow x = 200 - 200 + x$$

$$\Rightarrow 200 = 200$$

$$\Rightarrow t = 4 \text{ sec}$$

$$\text{আবার, } x = -4.9 \times 4^2 + 200$$

$$= 121.6 \text{ m}$$

$\therefore$ বস্তুটি ১২১.৬ম উচ্চতায় ৪sec পর
মিলিত হবে।

Shortcut: একটি বস্তুকে h উচ্চতায় ফেলে দেওয়া
হল। অপর একটি বস্তুকে $u \text{ ms}^{-1}$ বেগে খাড়া উপরে
নিষ্ক্ষেপ করা হল। বস্তু দুটির কখন এবং কত উচ্চতায় মিলিত
হবে? $h = 100 \text{ m}$

$$\Rightarrow \text{সময়, } t = \frac{h}{\text{আদিবেগ (নিম্নস্থ বস্তু)}}$$

$$\text{কোন উচ্চতায় মিলিত হবে, } x = h - 4.9t^2$$

৫৫.১m গাছের একটি দৃশ্যে আশ্রয় নিষ্ক্ষেপ করা হল।
কালের মধ্যে কালের বেগ ৩৫০ ms^{-1} হল আশ্রয় নিষ্ক্ষেপের
মুহুর্ত থেকে প্রতি পানিতে পতনের ক্ষয় মূহুর্তে অতিক্রান্ত
সময় = ?

Sub:

NOTE'S

Date:

Time:

⇒ পাতকর কালে পৌছাতে প্রয়োজনীয় সময় t_1 হলে
 $-h = -4.9 t_1^2$

$$\Rightarrow t_1^2 = \frac{h}{4.9} = \frac{44.1}{4.9} = 9$$

$$\Rightarrow t_1 = 3 \text{ sec.}$$

কূপের তলদেশে ২০০ কূপের উপরিকণে জল পৌছাতে
প্রয়োজনীয় সময় t_2 হলে,

$$t_2 = \frac{h}{v} = \frac{44.1}{340}$$

$$t_2 = 0.129 \text{ sec}$$

∴ জল পৌছতে প্রয়োজনীয় মুক্ত প্রয়োজনীয় সময়

$$t = t_1 + t_2$$

$$= 3 + 0.129$$

$$= 3.129 \text{ sec. (Ans.)}$$

Lecture - 3.06

21-12-2020

দ্বিমাত্রিক গতি বা স্পার্মের গতি

এই ক্ষেত্রে সরলরৈখিকভাবে চলমান বস্তুর গতির

সূত্রসমূহ:

$$v = u + at$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

Sub:

NOTES

Date:

Time:


উল্লম্ব বরাবর নিক্ষেপিত বস্তুর গতির সূত্রসমূহ:

$$v = u - gt$$

$$h = ut - \frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 = u^2 - 2gh$$

প্রাস: অনুভূমিকের সাথে তির্যকভাবে নিক্ষেপিত বস্তুর প্রাস বলে। প্রাসের গতিতে অর্থাৎ প্রাসের অনুভূমিক ও উল্লম্ব উভয় অক্ষ বরাবর সরণ ঘটে।



$t = 0$ সময়ে প্রাসের বিশিষ্টালা	$t = t$ সময়ে প্রাসের বিশিষ্টালা
মোদবেগ $= u$	মোদবেগ, $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$
মোদবেগের অনু: উপাংশ, $u_x = u \cos \theta_0$	মোদবেগের অনু: উপাংশ $= v_x$
মোদবেগের উল্লম্ব উপাংশ $u_y = u \sin \theta_0$	মোদবেগের উল্লম্ব উপাংশ $= v_y$

Sub:

NOTE'S

Date:

Time:


$t = 0$ সময়ে প্রাসের বাগিমাল্য	$t = t$ সময়ে প্রাসের বাগিমাল্য
অনু: সরণ, $x = 0$	অনু: সরণ, $x = ?$
উলম্ব সরণ, $y = 0$	উলম্ব সরণ, $y = ?$
মোট সরণ, $S = \sqrt{x^2 + y^2}$ $= 0$	মোট সরণ, $S = \sqrt{x^2 + y^2}$
অনু: ত্বরণ, $ax = 0$	অনু: ত্বরণ, $ax = 0$
উলম্ব ত্বরণ, $ay = -g$	উলম্ব ত্বরণ, $ay = -g$

t সময় পর প্রাসের বেগের অনু: উপাংশ, $V_x = u_x - gt$
 $= u_x = 0$

$$\Rightarrow V_x = u \cos \theta_0$$

t সময় পর প্রাসের বেগের উলম্ব উপাংশ, $V_y = u_y - gt$

$$\Rightarrow V_y = u \sin \theta_0 - gt$$



Sub: _____

NOTES


Date: _____

Time: _____


চিহ্ন- $ac = \text{constant}$

* নিচে বিভিন্ন ধরনের প্রাস নিম্নে আলোচনা করা হল:


Type-01: প্রকৌলক নিম্নে তলে ফিরে আসবে।




Type-02: বহু নিম্নে তলের নিচে অটুবে। বা কোনো ছাদ থেকে উল্লসের দিকে তির্যকভাবে নিক্ষেপিত বহু গতিময় যেখানে বহুটি ভূমিতে অটুবে।



Type-03: সো-




Type-04:



বিভিন্ন টাইপের প্রশ্নের
জন্য প্রশাসন সানিটাইজেশন
সুশ্রমস্বরূপ

22-12-20

Type-01: অনুভূমিকের সাথে — তীব্রভাবে টেপকে নিয়ন্ত্রণ
বস্তু পৌছাবে নিয়ন্ত্রণ তলে।



বেগ: $v = u + at$

x অক্ষ বরাবর বেগ: $v_x = u_x + at$

$$\Rightarrow v_x = u_x$$

$$\Rightarrow v_x = u \cos \theta_0$$

y অক্ষ বরাবর $v_y = u_y + at$

$$v_y = u \sin \theta_0 - gt$$

x অক্ষ বরাবর প্রশ্নের বেগ $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ *

x অক্ষ বরাবর অনুভূমিকের সাথে বেগের উৎপন্ন কোণ

০ হলে, $\tan \theta = \frac{v_y}{v_x}$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_y}{v_x} \right)$$

Sub:

NOTES

Date:

Time:

সংগ: $S = ut + \frac{1}{2}at^2$

অনুভূমিক বরাবর সংগ, $x = u_x t + \frac{1}{2}a_x t^2$

$$\Rightarrow x = u \cos \theta_0 t + 0$$

$$\Rightarrow x = u \cos \theta_0 t$$


উল্লম্ব বরাবর সংগ, $y = u_y t + \frac{1}{2}a_y t^2$

$$\Rightarrow y = u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$\Rightarrow y = u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

মোট সংগ, $S = \sqrt{x^2 + y^2}$

Type-02: বস্তুকে তীব্রকোণে উপরে নিক্ষেপ করি বস্তু পৌঁছাবে নিক্ষেপতলের নিচে।



বেগ: $v = u + at$

অনুভূমিক বরাবর বেগ, $v_x = u_x + a_x t$

$$= u \cos \theta_0 + 0$$

$$\Rightarrow v_x = u \cos \theta_0$$

Sub: _____

NOTE'S

Date: _____

Time: _____

উল্লম্ব বরাবর বেগ, $v_y = u_y + a_y t$
 $\Rightarrow v_y = u \sin \theta_0 - g t$

t সময় পর বেগ, $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

অনুভূমিকের সাথে শেখবেগের উৎকর্ষ কোণ, $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_y}{v_x} \right)$

সরণ: $s = ut + \frac{1}{2} at^2$

অনুভূমিক বরাবর সরণ, $x = u_x t + \frac{1}{2} a_x t^2$

$\Rightarrow x = u \cos \theta_0 t + 0$


$\Rightarrow x = u \cos \theta_0 t$

উল্লম্ব বরাবর সরণ, $y = u_y t + \frac{1}{2} a_y t^2$

$\Rightarrow y = u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2} g t^2$

মোট সরণ, $s = \sqrt{x^2 + y^2}$

Type-03: অনুভূমিকের সাথে তীর্থকভাবে নিচে নিক্ষেপ-



Sub:

NOTES

Date:

Time:

বেগ: $V = u + at$

অনুভূমিক বরাবর বেগ: $V_x = u_x + a_x t$

$$\Rightarrow V_x = u_x + 0$$

$$\Rightarrow V_x = u \cos \theta_0$$

উল্লম্ব বরাবর বেগ: $V_y = v + u_y + a_y t$

$$\neq V_y = -u \sin \theta_0 - g t$$

কাল সময়ে এর বেগ: $V = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_y}{v_x} \right)$$

সরণ: $S = ut + \frac{1}{2} at^2$

অনুভূমিক বরাবর সরণ: $s_x = u_x t + \frac{1}{2} a_x t^2$

$$= u \cos \theta_0 t + 0$$

$$\Rightarrow x = u \cos \theta_0 t$$


উল্লম্ব বরাবর সরণ: $y = u_y t + \frac{1}{2} a_y t^2$

$$= -u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$= -u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

মোট সরণ, $S = \sqrt{x^2 + y^2}$

Type-04: অনুভূমিকের সমান্তরালে নিক্ষেপ



Sub: _____

NOTE'S

Date: _____

Time: _____

ସୂତ୍ର: $v = u + at$

x: $v_x = u_x + a_x t$

$= u \sin \theta_0 + 0 \quad u \cos \theta_0 + 0$

$= u \sin \quad u \cdot 1 + 0$

$v_x = u$

y: $v_y = u_y + a_y t$

$= 0 + -gt$

$v_y = -gt$

$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

$\theta = \tan^{-1} \frac{v_y}{v_x}$

ସୂତ୍ର: $x = u_x t + \frac{1}{2} a_x t^2$

$x = u t + 0$

$\Rightarrow x = ut$

y: $y = u_y t + \frac{1}{2} a_y t^2$

$= 0 - \frac{1}{2} g t^2$

$y = -\frac{1}{2} g t^2$

ମୋଟ ସୂତ୍ର, $s = \sqrt{x^2 + y^2}$

Sub: _____

NOTE'S

Date: _____

Time: _____

সবগুলো Type একত্র মনে রাখা

x অক্ষ

y অক্ষ

বেগ, $V_x = u \cos \theta_0$

[সর্বদা]

বেগ, $V_y = u \sin \theta_0 - gt$

সরণ, $x = u \cos \theta_0 t$

সরণ, $y = u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2$

Lecture: 3-07

Date: 22-12-20

প্রাসঙ্গিক গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান


❖ 60 ms^{-1} বেগে একটি বস্তুকে অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে ছোঁড়ার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত করা হল

(i) 2 sec পর বস্তুটির বেগ, অনুভূমিকের সাথে বেগের কোণ এবং সরণ নির্ণয় কর।

(ii) 4 sec পর বস্তুটির অনুভূমিকের সাথে কোণ, বেগ এবং সরণ নির্ণয় কর।

(iii) 2 sec ও 4 sec এ বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করে দুটি বস্তুটির গতিপথ সম্বন্ধে কি বারংবার পেলো তা চিত্র সহ ব্যাখ্যা কর।

⇒ (i)



৪৩২। $t = 2 \text{ sec}$ এর বেগ $= V$ নির্ণয় করুন।

$$\begin{aligned} t = 2 \text{ sec এর } V_x &= u \cos \theta_0 \\ &= 60 \cos 30^\circ \\ &= 30\sqrt{3} \text{ ms}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{০২-২১-২২: } V_y &= u \sin \theta_0 - g t \\ &= 60 \sin 30^\circ - 9.8 \times 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 12.4 \text{ ms}^{-1} \\ &= 10.4 \text{ ms}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ বেগ } V &= \sqrt{V_x^2 + V_y^2} \\ &= \sqrt{(30\sqrt{3})^2 + (10.4)^2} \\ &= 52.992 \text{ ms}^{-1} \end{aligned}$$

অনুভূমিকের সাথে বেগের উৎকর্ষ কোণ, $\theta = \tan^{-1} \frac{V_y}{V_x}$

$$\Rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{10.4}{30\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \theta = 11.31^\circ$$

$t = 2 \text{ sec}$ এ

$$\begin{aligned} \text{প্রাথমিক অনুভূমিক সরণ, } x &= u \cos \theta_0 t \\ &= 60 \cos 30^\circ \times 2 \\ &= 60\sqrt{3} \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{উল্লম্ব সরণ, } y &= u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \\ &= 60 \sin 30^\circ \times 2 - 9.8 \times 4 \\ &= 60 - 19.6 \\ &= 40.4 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\text{মোট সরণ } x = \sqrt{(60\sqrt{3})^2 + (40.4)^2}$$

$$= 95.74 \text{ m}$$

(ii) 4 sec পর বস্তুটির বেগ, অনুভূমিকের সাথে কোণ
এবং সরণ নির্ণয় কর।

⇒ $t = 4 \text{ sec}$ পর -

$$\text{বস্তুটির অনুভূমিক বেগ, } v_x = u \cos \theta_0$$

$$= 60 \cos 30^\circ$$

$$= 30\sqrt{3}$$

$$\text{উল্লম্ব বরাবর বেগ, } v_y = u \sin \theta_0 - gt$$

$$= 60 \sin 30^\circ - 9.8 \times 4$$

$$= -9.2 \text{ m/s}$$

$$\therefore 4 \text{ sec পর বস্তুটির বেগ, } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$= \sqrt{(30\sqrt{3})^2 + (-9.2)^2}$$

$$= 51.14 \text{ m/s}$$

$$\text{অনুভূমিকের সাথে উৎপন্ন কোণ, } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_y}{v_x} \right)$$

$$\Rightarrow \theta = \tan^{-1} \left(\frac{-9.2}{30\sqrt{3}} \right)$$

$$= -10.04^\circ$$

$t = 4 \text{ sec}$ পর

$$\text{বস্তুটির অনুভূমিক সরণ, } x = u \cos \theta_0 t$$

$$= 60 \cos 30^\circ \times 4$$

$$= 120\sqrt{3}$$

$$\text{উল্লম্ব সরণ, } y = u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$= 60 \times \frac{1}{2} \times 4 - 4.9 \times 4^2$$


$$xy = 41.6 \text{ m.}$$

$$\begin{aligned} \text{মোট সরণ, } S &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ &= \sqrt{41.6^2 + (120\sqrt{3})^2} \\ &= 211.9 \text{ m} \\ &= 212 \text{ m} \end{aligned}$$

→ 200 m/s বেগে ছমি থেকে 490 m উঁচর দিয়ে একটি যুদ্ধবিমান অনুভূমিকভাবে উড়ে যাচ্ছে। 2000 m অনুভূমিক দূরত্বে একটি ক্ষুণ্ণাটি লক্ষ্য করে বিমান থেকে 5 kg ভরের একটি বোমা ফেলা হল।

- (i) 2 sec পর বোমাটির অবস্থান ডেঙ্কর নির্ণয় কর।
- (ii) বোমাটি ক্ষুণ্ণাটিতে চিকিৎকভাবে আঘাত হানতে পারবে কিনা?
- (iii) 3 sec পর বোমাটির ক্ষেত্র-যান্ত্রিক কাজের নিত্যতা জানিও হবে কিনা - প্রাণিতিকভাবে যাচাই কর।

→ (i)



Sub:

NOTE'S

Date:

Time:

$$\begin{aligned} t &= 2 \text{ sec} \text{ এর বোমাটির অনুভূমিক সরণ } x = ut \\ &= 200 \times 2 \\ &= 400 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{উল্লম্ব সরণ } y &= u \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \\ &= 0 - \frac{1}{2} \times 4 \cdot 9 \times 4 \\ &= -19.6 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore 2 \text{ sec} \text{ এর বোমাটির অবস্থান ভেক্টর, } \vec{r} &= x\hat{i} + y\hat{j} \\ &= 400\hat{i} - 19.6\hat{j} \end{aligned}$$

(ii) মনে করি, t সময় পর বোমাটি ভূমিতে পড়বে।

$$\begin{aligned} \therefore y &= -\frac{1}{2} g t^2 \\ -490 &= -4.9 t^2 \\ \Rightarrow t^2 &= 100 \\ \Rightarrow t &= 10 \text{ sec.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 10 \text{ sec} \text{ এ বোমাটির অনুভূমিক সরণ } x &= ut \\ &= 200 \times 10 \\ &= 2000 \text{ m.} \end{aligned}$$

$\therefore$ বোমাটি - ঠিক ঠিকভাবে আগু চাউটে আঘাত হানতে পারবে।

Date: 24 Dec 2020

→ 170m উচু কোনো তেবনের ছাদ থেকে একটি বস্তুকে 40 ms' প্রবেশে অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে নিক্ষেপ করা হল।

Sub:

NOTE'S

Date:

Time:

- i) ভূমিতে অর্ডে বস্তুটির কত সময় লাগবে?
 ii) ভবনের আদর্শিত্ব থেকে কতদূরে গিয়ে অর্ডে?
 iii) ভূমিতে কত কোণে আঘাত করবে?

$$\Rightarrow \textcircled{i} \quad y = \frac{1}{2}gt^2 \quad -y = -u\sin\theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$\Rightarrow +170$$

$$\Rightarrow 170 = 40\sin 30^\circ t + 4.9t^2$$

$$\Rightarrow 170 = 20t + 4.9t^2$$

$$\Rightarrow 4.9t^2 + 20t + 170 = 0$$

$$\Rightarrow t = 4.19 \text{ sec}$$

$\therefore$ ভূমিতে অর্ডে বস্তুটির 4.19 sec সময় লাগবে।

$$\textcircled{ii} \quad \text{ভবনের আদর্শিত্ব হতে অতিক্রান্ত দূরত্ব, } x = u\cos\theta_0 t$$

$$= 40 \cos 30^\circ \times 4.19$$

$$= 145.14 \text{ m}$$

$$\textcircled{iii} \quad v_x = +u_x + a_x t$$

$$= +u\cos\theta_0$$

$$= +40 \cos 30^\circ$$

$$= +20\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$$

$$v_y = -u\sin\theta_0 - gt$$

$$= -40 \times \frac{1}{2} - 9.8 \times 4.19$$

$$= -61.062 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{সেয়েহে, } V = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 70.2 \text{ ms}^{-1}$$

Sub:

NOTE'S

Date: 24-12-20.

Time:

$$\theta = \tan^{-1} \frac{v_y}{v_x}$$

$$= \tan^{-1} \left(\frac{-61.062}{20.13} \right)$$

$$= -60.4^\circ \quad (\text{Ans.})$$

Lecture-3.08.

→ প্রশ্ন কর যে, প্রাসের গতিবিধি - অরাত্রুত।

Proof:



$$x = u_x t$$

$$= u \cos \theta_0 t$$

$$\Rightarrow t = \frac{x}{u \cos \theta_0}$$

$$y = u_y t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$\Rightarrow y = u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\Rightarrow y = \frac{\sin \theta_0}{\cos \theta_0} \cdot x - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{u^2 \cos^2 \theta_0}$$

$$\Rightarrow y = x \tan \theta_0 - \frac{g x^2}{2 u^2 \cos^2 \theta_0}$$

$$\Rightarrow y = ax - bx^2$$


যা অরাত্রুতের সমীকরণ নির্দেশ করে।

$$a = \tan \theta_0$$

$$b = \frac{g}{2 u^2 \cos^2 \theta_0}$$

* যে কোনো প্রাসের উল্লম্ব সরণ $y = x \tan \theta_0 - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \theta_0}$

প্রাসের সর্বোচ্চ উচ্চতা নির্ণয়



$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$\Rightarrow v_y^2 = u_y^2 - 2gH$$

$$\Rightarrow H = 0 = \frac{u^2 \sin^2 \theta_0}{2g} - 2gH$$

$$\Rightarrow H = \frac{2g \cdot \frac{u^2 \sin^2 \theta_0}{2g}}{2g}$$

প্রাসের সর্বোচ্চ উচ্চতা, $H = \frac{u^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$

সর্বোচ্চ উচ্চতায় উপস্থিত সময়

$$v = u + at$$

$$\Rightarrow v_y = u_y + a_y t$$

$$\Rightarrow 0 = u_y - gt$$

$$\Rightarrow gt = uy$$

$$\Rightarrow t = \frac{uy}{g} = \frac{u \sin \theta_0}{g}$$

সময় উল্লেখ উঠতে সময়, $t = \frac{u \sin \theta_0}{g}$

সময় উল্লেখ হতে হিমিতে পৌঁছাতে সময়, $t = \frac{u \sin \theta_0}{g}$

উদ্ভয়নকাল বা বিচরণকাল নির্ণয়

$$y = u_y t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$\Rightarrow y = u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\Rightarrow 0 = u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\Rightarrow t (u \sin \theta_0 - \frac{1}{2} g t) = 0$$

$$\Rightarrow t = 0 \text{ অথবা, } \frac{1}{2} g t = u \sin \theta_0$$


$$t = \frac{2u \sin \theta_0}{g}$$

উদ্ভয়নকাল বা বিচরণকাল, $T = \frac{2u \sin \theta_0}{g}$

অনুভূমিক পাল্লা : প্রিয়কভাবে নির্দিষ্ট কোনো প্রাস-
নিষ্ক্ষেপ তলে পৌঁছাতে অনুভূমিকভাবে যতদূর দূরত্ব অতিক্রম
করে তাকে অনুভূমিক পাল্লা বলে।

কোনো প্রাস বিচরণকাল বা উদ্ভয়নকালের সময়ে অনু-

ভূমিকভাবে যে দূরত্ব অতিক্রম করে- তাকে অনুভূমিক পাল্লা বলে।



$$x = u_x t \quad \text{এবং} \quad \text{আনুমানিক} \quad \text{ত} \quad \text{আনুমানিক}$$

$$= u \sin \theta_0 t \quad u \cos \theta_0 t$$

$$R = u \sin \theta_0 T \quad u \cos \theta_0 T$$

$$= \frac{u \sin \theta_0 \times 2u \sin \theta_0 \times u \cos \theta_0}{g}$$

$$= \frac{2u^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

* অনুভূমিক পাল্লা, $R = \frac{u^2 \sin 2\theta_0}{g}$

সর্বোচ্চ অনুভূমিক পাল্লা নির্ণয়: : জানা-চলিছে

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

$$k = \frac{u^2}{g}$$

$$\Rightarrow R = k \sin 2\theta_0$$

$$\Rightarrow R \propto \sin 2\theta_0$$

R এর মান সর্বোচ্চ হবে যখন $\sin 2\theta_0$ সর্বোচ্চ হবে।

অর্থাৎ, $R_{\max}$ হতে হলে $\sin 2\theta_0 = 1$ হতে হবে।

$$\Rightarrow 2\theta_0 = 90^\circ$$

$$\Rightarrow \theta_0 = 45^\circ$$

$\therefore$ সর্বাধিক অনুভূমিক দাল্লা, $R_{\max} = \frac{u^2}{g}$

মুত্রের দূর

খাদ্য উল্লারে নিম্নলিখিত
বস্তু ক্রেত্র

প্রায়ের ক্রেত্র

① সর্বোচ্চ উচ্চতা,
 $h_{\max} = \frac{u^2}{2g}$

① সর্বোচ্চ উচ্চতা $h = \frac{u^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$

② সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে
সময়, $t = \frac{u}{g}$

② সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে সময়,
 $t = \frac{u \sin \theta_0}{g}$

③ সর্বোচ্চ উচ্চতা হতে নামতে
সময়, $t = \frac{u}{g}$

③ সর্বোচ্চ উচ্চতা হতে নামতে
সময়, $t = \frac{u \sin \theta_0}{g}$

④ বিচরণকাল, $T = \frac{2u}{g}$

④ বিচরণকাল, $T = \frac{2u \sin \theta_0}{g}$

⑤ অনুভূমিক দাল্লা

$$R = 0$$

⑤ অনুভূমিক দাল্লা

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

x অক্ষদ্বিতিক দূরত্বে, $y = x \tan \theta_0 - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \theta_0}$

$$\Rightarrow y = x \tan \theta_0 \left(1 - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \theta_0 \times x \tan \theta_0} \right)$$

$$\Rightarrow y = x \tan \theta_0 \left(1 - \frac{gx}{2u^2 \cos^2 \theta_0 \sin \theta_0} \right)$$

$$\Rightarrow y = x \tan \theta_0 \left(1 - \frac{x}{\frac{u^2 \sin 2\theta_0}{g}} \right)$$

$$\Rightarrow y = x \tan \theta_0 \left(1 - \frac{x}{R} \right)$$

* $y = x \tan \theta_0 \left(1 - \frac{x}{R} \right)$

→ একটি প্রাসঙ্গে কত কোণে নিষ্ক্ষেপ করলে এর অনুভূমিক আঙ্গা, মর্বোচ্চ উচ্চতার দ্বিগুন হবে?

$$\Rightarrow H = \frac{u^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$$

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

অনুমানিত $R = 2H$

$$\Rightarrow \frac{u^2 \sin^2 \theta_0}{g} = \frac{u^2 \sin 2\theta_0}{2g}$$

$$\Rightarrow \sin \theta_0 \cos \theta_0 - \sin \theta_0 = 0$$

Sub:

NOTE'S

Date:

Time:

$$\Rightarrow \sin \theta_0 (4 \cos \theta_0 - 1) = 0$$

$$\Rightarrow 4 \cos \theta_0 - 1 = 0$$

$$\text{অথবা, } \sin \theta_0 = 0$$

$$\Rightarrow \cos \theta_0 = \frac{1}{4}$$

$$\sec \theta_0 = 4$$

$$\Rightarrow \theta_0 = \cos^{-1} \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \theta_0 = 75.5^\circ$$

সর্বোচ্চ উচ্চতা ও অনুভূমিক আন্দোলনের সর্বোচ্চ সময়ক

$$H = \frac{u^2 \sin^2 \theta_0}{2g} \quad \text{--- (i)}$$

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta_0}{g} \quad \text{--- (ii)}$$

$$i \div ii \Rightarrow \frac{H}{R} = \frac{\sin^2 \theta_0}{2 \sin 2\theta_0}$$

$$\Rightarrow \frac{H}{R} = \frac{\sin \theta_0}{4 \cos \theta_0}$$

$$\Rightarrow \tan \theta_0 = \frac{4H}{R}$$

$$* \tan \theta_0 = \frac{4H}{R}$$

একটি প্রাসকে কত কোণে নিষ্ক্ষেপ করলে এর অনুভূমিক আন্দোলন সর্বোচ্চ উচ্চতা দ্বিগুণ হবে?


$$\Rightarrow \tan \theta_0 = \frac{4H}{B} = \frac{4H}{2H}$$

$$\theta_0 = \tan^{-1}(2)$$

$$\theta_0 = 63.4^\circ \text{ (Ans)}$$


৪→ একটি প্রাচীরে নিম্নোক্তরূপে কতকগুলি কতকগুলি পদ এবং আদিগুণ
এবং আধবেগ পরস্পর লম্ব হবে।

⇒



Lecture: 3.09

❖ অনুকমিকের সাথে 30° কোণে 50 ms^{-1} বেগে একটি বল ছোঁড়া হল। বলটি 50 m দূরত্বে অনুকমিক দূরত্বে অবস্থিত কোনো দেয়ালকে কত উচ্চতায় আঘাত করবে?



Method 1:

$$x = u \cos 30^\circ t$$

$$\Rightarrow t = \frac{x}{u \cos 30^\circ} = \frac{50}{50 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ sec.}$$

$$y = u_y t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$= u \sin 30^\circ t - 4.9 t^2$$

$$= 50 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} - 4.9 \times \frac{4}{3}$$


$$= 22.33 \text{ m.}$$

Method $\rightarrow$ 02:

$$\begin{aligned}
 y &= x \tan \theta_0 - \frac{g x^2}{2 u^2 \cos^2 \theta_0} \\
 &= 50 \tan 30^\circ - \frac{9.8 \times 50^2}{2 \times 50^2 \times \frac{3}{4}} \\
 &= 22.33 \text{ m}
 \end{aligned}$$

সুতরাং বলটি ৫০ম অনুভূমিক দূরত্বে অবস্থি দেয়ালকে ২২.৩৩ম উচ্চতায় আঘাত করবে।

৪. এক সমতল মাঠে নির্দিষ্ট একটি বল ভূমিতে পড়ার আগে অনুভূমিকভাবে ১৭ম দূরত্ব অতিক্রম করে। ভূমি হতে ১.৫ম উপর থেকে অনুভূমিকের সাথে 16° কোণে নিষ্ক্ষেপ করা হলে বলটির আদিবেগ কত?



$$x = u_x t$$

$$17 = u \cos 16^\circ t$$

$$\Rightarrow u t = 17.68$$

$$\text{আবার } y = u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\Rightarrow -1.5 = 17.68 \sin 16^\circ - 4.9 t^2$$

$$\Rightarrow t = 1.14 \text{ sec}$$

$$\therefore \text{আদিবেগ, } u = \frac{17.68}{1.14}$$

$$\Rightarrow u = 15.508 \text{ ms}^{-1} \text{ (Ans.)}$$

$$\text{বিকল্প সমীকরণ: } y = x \tan \theta_0 - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \theta_0}$$

$$\Rightarrow -1.5 = 17 \tan 16^\circ - \frac{9.8 \times 17^2}{2u^2 \cos^2 16^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{9.8 \times 17^2}{2u^2 \cos^2 16^\circ} = 17 \tan 16^\circ + 1.5$$

$$\Rightarrow u = 15.5 \text{ ms}^{-1} \text{ (Ans.)}$$

❖ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের T-20 খেলা হচ্ছে মিরপুর স্টেডিয়ামে। ব্যাট করছে আফ্রিদি, বলে ক্যাপ্টেন অফ দ্য টাইগার মাক্সরাফি। আফ্রিদি ব্যাট দিয়ে 25 ms^{-1} বেগে অল্প ছমিকের সাথে 40° কোণে বলে আঘাত করে। রবুল আফ্রিদি হতে 79.20 m দূরে ফিল্ডিং করতেন। বলটি ক্যাচ করার জন্য 25 ms^{-1} বেগে সামনে দৌড়ে আসল। (দ্বিমাত্রিক গতি)

(i) বলটি সুবোর্ড রত উচ্চতায় পৌঁছাবে?

(ii) মাক্সরাফি কি উইকেট পাবে? গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা দাও।

$$\Rightarrow \textcircled{i} \text{ সর্বাধিক উচ্চতা } H = \frac{u^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$$

$$= \frac{(25)^2 (\sin 40^\circ)^2}{2 \times 9.8}$$

$$H = 13.175 \text{ m}$$

$$\textcircled{ii} \text{ বলটির অনুভূমিক অতিক্রান্ত দূরত্ব, } R = \frac{u^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

$$= \frac{25^2 \sin 80^\circ}{9.8}$$

$$= 62.80 \text{ m}$$

$$\text{বলটির বিবেগকাল, } T = \frac{2u \sin \theta_0}{g}$$

$$= \frac{2 \times 25 \sin 40^\circ}{9.8}$$

$$= 3.27 \text{ sec}$$

$$\text{ক্যাচ রিমে বুঝলেব সরণ, } S = (79.207 - 62.8) \text{ m}$$

$$= 16.407 \text{ m}$$

$$\text{প্রয়োজনীয় সময়, } t = \frac{S}{v}$$

$$= \frac{16.407}{5}$$

$$= 3.27$$

Sub: _____

NOTE'S

Date: _____

Time: _____

$\therefore T = x$ । ফলে বুঝেন ক্যাচ ঝুঁতে পারবে এবং মাঝরাশি টেইকটে পারে।

দেখাও যে, একটি নির্দিষ্ট বেগে 0° ও $90^\circ - \theta_0$ কোণে নিক্ষেপের জন্য প্রাসের অনুভূমিক আন্দা সমান থাকে?

$$\Rightarrow R = \frac{u^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

$$\Rightarrow \sin 2\theta_0 = \frac{Rg}{u^2}$$

$$\Rightarrow \frac{2 \tan \theta_0}{1 + \tan^2 \theta_0} = \frac{Rg}{u^2}$$

$$\Rightarrow 2u^2 \tan \theta_0 = Rg + Rg \tan^2 \theta_0$$

$$\Rightarrow Rg \tan^2 \theta_0 - 2u^2 \tan \theta_0 + Rg = 0$$

$$\tan \theta_{01} \times \tan \theta_{02} = \frac{Rg}{Rg}$$

$$\Rightarrow \tan \theta_{01} = \frac{1}{\tan \theta_{02}}$$

$$\Rightarrow \tan \theta_{01} = \cot \theta_{02}$$

$$\Rightarrow \tan \theta_{01} = \tan (90^\circ - \theta_{02})$$

$$\Rightarrow \theta_{01} = 90^\circ - \theta_{02}$$


$$\Rightarrow \theta_{01} + \theta_{02} = 90^\circ$$

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট আদিবেগে-নির্দিষ্ট প্রাসের একটি অনুভূমিক আন্দার পরা যে দুটি নিক্ষেপণ কোণ-বিদ্যমান তাদের সমষ্টি 90° ।

→ একটি ফুটবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালে দু'জন খেলোয়াড় উচ্চায় 10 m/s বেগে সমান্তরালে 30° ও 60° কোণে ফুটবল কিক দিলো। একজন গোলকিপার বলদুটিকে মাটিতে পড়বার আগমুহুর্তে ধরার জন্য দাড়ায়েছিলেন।

(i) ১ম খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে 1 sec পর বলের বেগের মান কত?

(ii) গোলকিপার স্থান পরিবর্তন না করে - কিসে সময়ে বলদুটি ধরতে সক্ষম হবে - গাণিতিকভাবে যাচাই কর।



$$\begin{aligned}
 v_x &= u_x t \\
 &= u \cos 30^\circ t \\
 &= 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \times 1 \\
 &= 5\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 v_y &= u_y t - gt \\
 &= 5 - 9.8 \\
 &= -4.8 \text{ m/s}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\
 &= 9.9 \text{ m/s}
 \end{aligned}$$

Sub:

NOTE'S

Date:

Time:

$$(i) (90^\circ) \Rightarrow R_1 = \frac{10^2 \sin^2 60^\circ}{g}$$

$$= 8.83 \text{ m}$$

$$(60^\circ) \Rightarrow R_2 = \frac{10^2 \sin^2 30^\circ}{g}$$

$$= 8.83 \text{ m}$$

$\therefore R_1 = R_2$ । একই কামগাম দাঁড়িয়ে থাকা কারণে।

$$T_1 = \frac{2u \sin \theta}{g} = \frac{2 \times 10 \times \frac{1}{2}}{9.8} = 1.02 \text{ sec}$$


$$T_2 = \frac{2u \sin 60^\circ}{g}$$

$$= 1.76 \text{ sec}$$

$T_1 \neq T_2$ । তিন সময়ে বলদটি থাকা সম্ভব
হবে।

Lecture $\rightarrow$ 3.10

25 Dec 2020



a ও b আনুমানিক ক্ষমিতে একই স্থানে পতিত হয়।

- (i) a প্রাসটির সর্বাধিক উচ্চতা নির্ণয় কর
 (ii) তবনের উচ্চতা নির্ণয় সম্ভব কিনা প্রতিষ্ঠিত করে-
 যাচাই কর।

$$\Rightarrow \text{(i) সর্বাধিক উচ্চতা } H = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

$$= \frac{40^2 \sin^2(30)}{2 \times 9.8}$$

$$= 20.4 \text{ m}$$

(ii) a প্রাসের অনুভূমিক দূরত্ব $R = x = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$

$$= \frac{40^2 \sin 60}{9.8}$$


$$= 141.39 \text{ m}$$

তবনের উচ্চতা $-y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \theta}$

$$\Rightarrow -y = 141.39 \times 0 - \frac{9.8 \times 141.39^2}{2 \times 30^2}$$

$$\Rightarrow y = 108.84 \text{ m. (Ans.)}$$

তবনের উচ্চতা 108.84 m.



(i) বলটি সর্বাধিক কত উচ্চতায় উঠবে?

(ii) নেইমার গোল করতে সমর্থ হবে কি? গাণিতিকভাবে যাচাই কর।

$$\Rightarrow \textcircled{i} \text{ সর্বাধিক উচ্চতা, } H = \frac{u^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$$

$$= \frac{25^2 \sin^2 27^\circ}{2 \times 9.8}$$

$$= 6.57 \text{ m}$$


$$\textcircled{ii} y = x \tan 27^\circ - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 27^\circ}$$

$$= 45 \tan 27^\circ - \frac{9.8 \times 45^2}{2 \times 25^2 \cos^2 27^\circ}$$

$$= 2.93 \text{ m}$$

বলটি গোলপোস্টের উপর দিখে নে পারবে। কমে নেইমার গোল করতে সমর্থ হবে না।

Ex



ab এর দৈর্ঘ্য = ?

$$\Rightarrow y = x \tan \theta_0 - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \theta_0}$$

$$\Rightarrow 4 = x \tan 30^\circ - \frac{9.8x^2}{2 \times 30^2 \cos^2 30^\circ}$$

$$\Rightarrow 4 = \frac{x}{\sqrt{3}} - 7.25 \times 10^{-3} x^2$$

$$\Rightarrow 7.25 \times 10^{-3} x^2 - \frac{x}{\sqrt{3}} + 4 = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = 7.66 \text{ m}$$

$$x_2 = 71.96 \text{ m}$$

$$\therefore ab = 71.96 - 7.66$$

$$= 64.20 \text{ m}$$